

Экспресс-маршрут

К выздоровлению



Амоксициллин Экспресс
Полусинтетический антибиотик широкого спектра действия из группы пенициллинов в форме диспергируемых таблеток¹

125 мг 250 мг 500 мг 1000 мг

* Следует принимать во внимание официальные руководства для каждого из показаний.

** Только в случае назначения амоксициллина в верхнем диапазоне доз следует рассматривать возможность применения два раза в сутки.

Дети с массой тела < 40 кг ¹⁻⁵	
Показание к применению*	Доза*
<ul style="list-style-type: none"> Острый бактериальный синусит Острый цистит Острый пиелонефрит Дентальный абсцесс с воспалением подкожной клетчатки 	40-90 мг/кг/сутки, разделенная на 2-3 приема**
Острый средний отит	50-60 мг/кг/сутки ³
Внебольничная пневмония	45-90 мг/кг/сутки, но не более 2000 мг/сутки ⁵
Острый стрептококковый тонзиллит и фарингит	40-90 мг/кг/сутки, разделенная на 2-3 приема**
Тиф и паратиф	100 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема
Профилактика бактериального эндокардита при хирургических процедурах в ротовой полости и верхних дыхательных путей	50 мг/кг перорально, однократная доза за 30-60 минут до хирургической процедуры в ротовой полости и верхних дыхательных путей
Болезнь Лайма	<p>Ранняя стадия: 25-50 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема, в течение 10-21 дней.</p> <p>Поздняя стадия (системная инфекция): 100 мг/кг/сутки, разделенная на 3 приема, в течение 10-30 дней</p>

1. ИМП Амоксициллин Экспресс; 2. Острый синусит, Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 3. Отит средний острый. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 4. Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит), Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 5. Пневмония (внебольничная), Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022. Информация предназначена для специалистов здравоохранения

Взрослые и дети ≥ 40 кг ¹⁻⁵	
Показание к применению*	Доза*
<ul style="list-style-type: none"> Острый бактериальный синусит Острый средний отит 	по 500-1000 мг 3 раза в сутки
<ul style="list-style-type: none"> Бессимптомная бактериурия во время беременности Острый пиелонефрит Дентальный абсцесс с воспалением подкожной клетчатки Острый цистит 	250 мг - 500 мг каждые 8 часов или 750 мг - 1 г каждые 12 часов При тяжелых инфекциях 750 мг - 1 г каждые 8 часов Для лечения острого цистита возможен прием по 3 г два раза в сутки
Острый стрептококковый тонзиллит и фарингит	по 500 мг 2-3 раза в сутки
Обострение хронического бронхита	500 мг 3 раза в сутки или 750 мг - 1 г 2 раза в сутки При тяжелых инфекциях 750 мг - 1 г 3 раза в сутки в течение 10 дней
Внебольничная пневмония	500 мг - 1 г каждые 8 часов
Тиф и паратиф	500 мг - 2 г каждые 8 часов
Инфекции протезированных суставов	500 мг - 1 г каждые 8 часов
Профилактика бактериального эндокардита при хирургических процедурах в ротовой полости и верхних дыхательных путей	2 г перорально, однократная доза за 30-60 минут до хирургической процедуры в ротовой полости и верхних дыхательных путей
Эрадикация <i>Helicobacter pylori</i>	750 мг - 1 г два раза в сутки в комбинации с ингибитором протонной помпы (например, омепразол) и другим антибиотиком (например, кларитромицин, метронидазол) в течение 7 дней
Болезнь Лайма	<p>Ранняя стадия: 500 мг - 1 г каждые 8 часов, максимальная суточная доза 4 г, разделенная на несколько приемов, в течение 14 дней (от 10 до 21 дня).</p> <p>Поздняя стадия (системная инфекция): 500 мг - 2 г каждые 8 часов, максимальная суточная доза 6 г, разделенная на несколько приемов, в течение 10-30 дней</p>

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



125 МГ+
31,25 МГ
250 МГ+
62,5 МГ
500 МГ+
125 МГ
875 МГ+
125 МГ

**Амоксициллин +
Клавулановая кислота Экспресс**
Полусинтетический антибиотик
широкого спектра действия из группы
пенициллинов + бета-лактамаз
ингибитор в форме диспергируемых
таблеток¹



400 МГ

Цефиксим Экспресс
Полусинтетический антибиотик
широкого спектра действия из группы
цефалоспоринов III поколения
в форме диспергируемых таблеток²

Вес, кг	Амоксициллин + Клавулановая кислота Экспресс ^{3-6*}	Цефиксим Экспресс ²
3	по ½ таб. 125 мг/31,25 мг 2 раза в сутки	
4	по ½ таб. 125 мг/31,25 мг 3 раза в сутки	
5-6	по 1 таб. 125 мг/31,25 мг 2 раза в сутки	
7-8	по 1 таб. 125 мг/31,25 мг 3 раза в сутки	
9-12	по 1 таб. 250 мг/62,5 мг 2 раза в сутки	
13-17	по 1 таб. 250 мг/62,5 мг 3 раза в сутки	
18-24	по 1 таб. 500 мг/125 мг 2 раза в сутки	
25-39	по 1 таб. 500 мг/125 мг 3 раза в сутки	1 раз в день по ½ таб. 400 мг
40-49	по 1 таб. 875 мг/125 мг 2 раза в сутки	1 раз в день по ½ таб. 400 мг
≥50	по 1 таб. 875 мг/125 мг 2 раза в сутки	1 раз в день по 1 таб. 400 мг

1. ИМП Амоксициллин+КК Экспресс 2. ИМП Цефиксим Экспресс 3. Острый синусит. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 4. Отит средний острый. Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 5. Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2021. 6. Пневмония (внебольничная). Клинические рекомендации МЗ РФ, 2022.
Информация предназначена для специалистов здравоохранения

*Режим дозирования препарата Амоксициллин+Клавулановая кислота Экспресс приведен в соответствии с официальными Клиническими рекомендациями МЗ РФ